

Helsetilsynets oppfølging av beredskaps- og smittevernplaner

Ved årsskiftet 2004-2005 var det bare et fåtall kommuner som ikke hadde smittevernplaner. For fem år siden manglet slike planer i mer enn halvparten av landets kommuner.

Sars-epidemien i 2003 og utbruddet av fugleinfluensa i Sørøst-Asia i 2004 med risiko for utvikling av influensapandemi, utfordret smittevernberedskapen også i vårt land. I 2003 kartla Helsetilsynet status for kommunenes smittevernplaner og planer for helsemessig og sosial beredskap (1). Et år senere rapporterte Helsetilsynet i fylkene at de fleste kommunene hadde fått på plass smittevernplaner, men at planer for helsemessig og sosial beredskap fortsatt manglet i mange kommuner.


På bakgrunn av pandemirusselen vinteren 2004 i tillegg til usikkerheten rundt kommunenes planlagte beredskap, fant Helsetilsynet det påkrevd å intensivere oppfølgingen av kommunene som fortsatt

ikke hadde planene på plass. Til noen kommuner har det vært nødvendig å gi pålegg om å få forholdene i orden. Ved årsskiftet 2004-2005 manglet kun noen få kommuner smittevernplaner (fig 1). Den tilsynsmessige oppfølgingen knyttet til planer for helsemessig og sosial beredskap fortsetter i 2005.

Helsetilsynet bad også de regionale helseforetakene redegjøre for status i forhold til smittevernplan og beredskap med tanke på influensapandemi. I den videre oppfølgingen fikk ett regionalt helseforetak varsel om pålegg om å få forholdene i orden. Helseforetakenes planer for helsemessig- og sosial beredskap ble også fulgt opp og dette arbeidet

fortsetter i 2005. Oppfølgingen av kommuner og helseforetak har skjedd i samarbeid med Helsetilsynet i fylkene.

For Helsetilsynet har det underveis i oppfølgingen vært viktig å understreke at virksomhetene skal utføre beredskapsplanlegging som gjør dem i stand til å yte nødvendige helse- og sosialtjenester ved kriser og katastrofer som innebærer ekstraordinære belastninger for virksomheten.



Litteratur

1. Kartlegging av kommunenes beredskap på smittevernområdet pr. juni 2003. Rapport fra Helsetilsynet 7/2003. Oslo: Statens helsetilsyn, 2003.